

臺灣菸酒股份有限公司 101 年從業評價職位人員甄試試題

甄試類別【代碼】：護士【C9915】

專業科目 1: 護理學概要

* 請填寫入場通知書編號：_____

注意：①作答前須檢查答案卡、入場通知書編號、桌角號碼、應試類別是否相符，如有不同應立即請監試人員處理，否則不予計分。
②本試卷一張雙面共 40 題，每題 2.5 分，限用 2B 鉛筆在「答案卡」上作答，請選出最適當答案，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。
③應考人得自備簡易型電子計算機，但不得發出聲響，且不具財務、工程及儲存程式功能。應考人於測驗時將不符規定之電子計算機放置於桌面或使用，經勸阻無效，仍執意使用者，該科扣 10 分；計算機並由監試人員保管至該節測驗結束後歸還。
④答案卡務必繳回，違反者該科成績以零分計算。

【3】1. 護理人員照顧出血型腦中風的病人時，下列何項護理活動最合適？

- ①鼓勵病人深呼吸及咳嗽
- ②建議醫師給予 warfarin (coumadin) 服用
- ③躺臥時抬高床頭 30 度
- ④鼓勵病人盡量多攝取水分

【4】2. 護理人員照顧有休克徵象的病人時，宜協助其採用何種臥位？

- ①平躺，頭部抬高 30 度
- ②半坐臥式
- ③左側臥式
- ④平躺，並將雙腳抬高

【2】3. 為了增加重症病人的免疫力，護理人員宜建議此類病人補充下列哪項營養素？

- ①碳水化合物
- ②蛋白質
- ③維生素
- ④礦物質

【1】4. 一位乳癌病人接受化學治療藥物 5-FU (fluorouracil) 的注射，出現口腔炎副作用，而且感到口腔疼痛，此時最合適的護理措施是下列何項？

- ①進食後加強漱口及口腔清潔
- ②停止進食，等口腔黏膜不疼痛後再進食
- ③保持口腔黏膜乾燥
- ④多攝取高纖維飲食以減少疼痛

【1】5. 護理人員給予民眾登革熱防治的衛教教導，下列何者最正確？

- ①噴灑殺蟲劑範圍需以住屋為中心，周圍半徑 50 公尺為準
- ②罹患登革熱的病人需接受腸道隔離
- ③注射登革熱疫苗即有免疫力，無需擔心再被傳染
- ④傳染登革熱的埃及斑蚊及白線斑蚊多在夜間吸血，所以孩童夜晚不宜出門

【3】6. 護理人員對胃潰瘍患者的飲食衛教中，建議不宜使用下列何種食物？

- ①水果沙拉
- ②燙青菜
- ③冰咖啡
- ④蘇打餅乾

【1】7. 護理人員為糖尿病人進行足部的護理指導時，下列何者最正確？

- ①修剪其趾甲時，趾甲面修成直線不可短於底部趾甲床
- ②若其足底有雞眼，宜強行撕去痂皮
- ③鼓勵其冬天多使用熱水袋及電毯，以防足部凍瘡
- ④要其常穿著緊身褲襪，以促進足部血液循環

【2】8. 護理人員可以採用下列何種方法以提升慢性阻塞性肺疾病人居家之生活品質？

- ①教導病人攝取低熱量、低蛋白之飲食
- ②教導並協助病人適當的呼吸及運動訓練
- ③教導病人呼吸時減少呼吸輔助肌的使用
- ④教導病人要維持動脈血氧分壓在 60 - 70 mmHg

【2】9. 護理人員對急性腎衰竭病人的飲食指導，下列何者最合適？

- ①高熱量、高蛋白
- ②高熱量、低蛋白
- ③低熱量、低蛋白
- ④低熱量、高蛋白

【1】10. 護理人員對心絞痛病人使用硝酸甘油酯 (nitroglycerin, NTG) 舌下含片的護理指導，下列何者最正確？

- ①心絞痛發作時，將一粒 NTG 置於舌下後，躺下休息觀察
- ② NTG 置入舌下，舌尖若有辛辣感表示藥物失效，立刻通知護理人員
- ③服用 NTG 後，如胸痛未解除，可每隔 3 分鐘含一粒直至不再胸痛
- ④ NTG 藥丸應裝入透明的塑膠袋內，隨身攜帶

【3】11. 針對生產後想要用子宮內避孕器(IUD)避孕的產婦而言，其 IUD 裝置的理想時間為何？

- ①產後立即裝置
- ②產後第一次月經開始時裝置
- ③產後 4~6 週裝置
- ④產後第一次門診時裝置

【3】12. 護理人員提醒孕婦在懷孕時期避免抽煙，其最主要的原因為何？

- ①抽煙的孕婦容易使新生兒產生呼吸窘迫症候群
- ②抽煙的孕婦容易使胎兒腦部缺損
- ③抽煙的孕婦容易生出低體重嬰兒
- ④抽煙的孕婦容易使胎兒產生心臟血管疾病

【4】13. 護理人員為兒童進行心肺復甦術 (CPR) 時，應該用何種方法暢通兒童的呼吸道？

- ①將兒童的頭側向一邊
- ②讓兒童平躺並張開嘴巴
- ③讓兒童俯臥並拍背部
- ④抬提兒童下巴並壓額頭

【1】14. 下列檢查何者是測試橈動脈及尺動脈阻塞狀況？

- ① Allen test
- ② Leg raising test
- ③ Homan's test
- ④ Trendelenburg test

【3】15. 目前長照機構常用的巴氏量表 (Barthel index)，主要是用來評估什麼能力？

- ①認知功能程度
- ②感覺功能程度
- ③生理缺損所影響的功能程度
- ④社會化功能程度

【2】16. 在社區評估方法中，何者是以統計資料來判斷社區的健康狀況？

- ①參與式觀察
- ②社會指標
- ③雨刷式統計
- ④自我報告

【1】17. 護理人員照顧一位對病房的環境顯出多疑、不安，並具有強烈被害妄想之精神病患者，最適當的護理措施為下列何項？

- ①傾聽、接受病人並呈現事實
- ②即時糾正病人的多疑行為
- ③再三保證所有的規定都是為了病人
- ④限制病人的言論

【4】18. 鄭先生因為跳樓自殺未遂而住院，據病歷記載他已有數次自殺的記錄。為了保護鄭先生，並且預防再度自殺，護理人員應使用下列何種護理措施最為適當？

- ①請醫師開立高劑量的鎮定劑
- ②提供安靜的環境讓鄭先生重新思考
- ③將鄭先生轉住多人房以防止再自殺
- ④移除環境中具危險性的東西

【請接續背面】

【4】19.二歲的李小弟因為中耳發炎，護理人員依醫囑為他執行耳滴藥時，需要將李小弟的耳垂輕拉至何方向，以使藥物順利到達發炎的位置？

- ①向前向上拉 ②向前向下拉 ③向後向上拉 ④向後向下拉

【1】20.使用三角巾懸掛受傷手臂時，下列何項是維持該手臂功能性位置之正確方法？

- ①將肘關節彎曲小於 90 度，三角巾需托住手腕
②將肘關節彎曲維持 90 度，並使手腕自然下垂
③將肘關節彎曲大於 90 度，並讓手肘自然露出
④將肘關節彎曲至舒適位置，並使手腕自然下垂

【2】21.我國全民健康保險於何時開始正式實施？

- ①民國 82 年 1 月 ②民國 84 年 3 月 ③民國 86 年 5 月 ④民國 88 年 7 月

【1】22.有關季節性流行性感冒，下列敘述何者正確？

- ①台灣流感好發於秋、冬兩季 ②其感染途徑須經由媒介物
③青壯年是主要感染對象 ④ H5N1 流感是非指定傳染病

【2】23.上呼吸道感染病童最常見的合併症為下列何項？

- ①扁桃腺炎 ②中耳炎 ③鼻竇炎 ④會厭炎

【4】24.李小弟因哮喘送至急診，下列護理處置何者不適當？

- ①提供潮濕的氧氣 ②觀察輸入及輸出量
③降低病童焦慮 ④立即抽痰

【2】25.李小妹因腹瀉入院治療，為了保護其臀部皮膚的護理措施，下列何者不適當？

- ①經常更換尿布避免糞便浸潤皮膚 ②使用含酒精的濕紙巾使皮膚乾爽
③可塗擦羊毛脂保護皮膚 ④破皮處可噴灑無痛保護膜

【2】26.下列抽血檢驗數據，何者顯示病人發生手術後併發症的危險性增加？

- ① fasting glucose 105 mg/dl ② creatinine 2.4 mg/dL
③ Hb 12 g/dL ④ Na⁺ 145 mEq/L

【3】27.有關心肌梗塞病人的護理處置，下列何者錯誤？

- ①說明治療措施，減緩其焦慮
②鼓勵戒菸、控制血壓
③病人在心肌梗塞一個月內即可恢復性生活
④定期返診按時服藥

【3】28.白太太有膽結石多年病史，昨天與朋友聚餐後回家，出現右腹絞痛，醫師診治為急性膽囊炎，其輻射痛會出現於哪個部位？

- ①後頸部 ②左手臂 ③右肩部 ④尾椎處

【2】29.有關疼痛的描述，下列何者正確？

- ①疼痛是以客觀的觀察為主 ②疼痛是不愉快的感覺及情緒經驗
③疼痛出現一定有生理原因可以發現 ④慢性疼痛對刺激敏感度較差

【4】30.有關緩和醫療照護 (palliative care)之敘述，下列何者不適當？

- ①提供症狀緩解的處置 ②視死亡為一種自然的過程
③可增加病人生活品質 ④是一種延緩死亡的照顧

【1】31.近年國民健康局推動國人四項癌症篩檢，何者不在此範圍內？

- ①肝癌 ②口腔癌 ③乳癌 ④子宮頸癌

【3】32.下列何種維生素在傷口癒合過程中可協助膠原合成及新血管形成？

- ①維生素 A ②維生素 B 群 ③維生素 C ④維生素 D

【3】33.有關嬰幼兒預防接種的敘述，下列何者正確？

- ① B 型肝炎疫苗在出生滿一個月時注射第一劑
②五合一混合疫苗在出生後六個月注射第一劑
③日本腦炎疫苗第一劑與第二劑間隔兩週
④卡介苗在國小一年級入學時一律追加一劑

【2】34.目前針對未到院前，若由二人執行急救措施，其人工呼吸與心臟按摩比例為何？

- ① 1:15 ② 2:30 ③ 3:50 ④ 5:100

【1】35.急性心包填塞 (acute cardiac tamponade) 的臨床表徵會出現貝克式三病徵(Beck' s triad)，下列何者不是貝克式三病徵？

- ①舒張壓下降 ②頸靜脈怒張
③動脈性低血壓 ④低沉的心音

【2】36.有關周邊動脈功能不全的臨床表徵，下列何者正確？

- ①肢體下垂時皮膚呈紫紅色 ②間歇性跛行
③肢體下垂會出現水腫 ④出現鬱積性皮膚炎

【2】37.有關調整生活型態對高血壓控制的效果，下列何者對降低收縮壓的效應最大？

- ①避免過量飲酒 ②減輕體重
③增加身體活動量 ④減少咖啡因攝取

【1】38.有關控制高血壓的藥物，下列何者之作用不具有降低周圍血管阻力之效果？

- ①利尿劑 ②血管擴張劑
③鈣離子通道阻斷劑 ④血管緊縮素轉換? 抑制劑

【3】39.高血壓病人合併有糖尿病時，其血壓控制目標應為下列何者最適當？

- ① < 110/70 mmHg ② < 120/75 mmHg
③ < 130/80 mmHg ④ < 140/90 mmHg

【2】40.對於個案在推理、判斷、記憶力、計算及解決問題能力之評估，是屬於全人評估架構中的哪一項？

- ①心理層面 ②認知層面
③社會層面 ④人類發展層面