

臺灣菸酒股份有限公司 104 年從業職員及從業評價職位人員甄試試題  
甄試類別【代碼】：從業評價職位人員／護理【H6738】  
專業科目 1：護理學概要

\*請填寫入場通知書編號：\_\_\_\_\_

注意：①作答前須檢查答案卡、入場通知書號碼、桌角號碼、應試類別是否相符，如有不同應立即請監試人員處理，否則不予計分。  
②本試卷一張雙面共 50 題，每題 2 分，限用 2B 鉛筆在「答案卡」上作答，請選出最適當答案，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。  
③請勿於答案卡書寫應考人姓名、入場通知書號碼或與答案無關之任何文字或符號。  
④本項測驗僅得使用簡易型電子計算器(不具任何財務函數、工程函數功能、儲存程式功能)，但不得發出聲響；若應考人於測驗時將不符規定之電子計算器放置於桌面或使用，經勸阻無效，仍執意使用者，該節扣 10 分；該電子計算器並由監試人員保管至該節測驗結束後歸還。  
⑤答案卡務必繳回，違反者該節成績以零分計算。

- 【2】1.下列何者不是登革熱的警示徵象？  
①嗜睡 ②便秘 ③皮膚出現出血點 ④四肢冰冷且濕黏
- 【1】2.我國長期照護服務系統中的單一窗口為何？  
①長期照護管理中心 ②社區衛生所 ③社區老人服務中心 ④居家護理機構
- 【2】3.下列何者不是職業衛生護理師的工作範圍？  
①傷病員工的照顧 ②負責工廠的污水處理  
③協助瞭解生產力不佳的員工 ④早期發現工作場所中危害健康的因素
- 【2】4.關於各種傳染病的相關敘述，何者正確？  
①所有腸病毒的個案都會有拉肚子的症狀  
②在臺灣結核病屬第三類法定傳染病  
③預防流感的唯一方法是在每年秋季接種流感疫苗  
④與未發病的潛伏感染肺結核的個案共同居住者，屬於結核病接觸者，須立即被隔離
- 【3】5.吳先生因右脛骨骨折採石膏固定，醫囑其右腳不宜負重，可用拐杖行走，其拐杖最適宜的步態為何？  
①搖擺式 ②四點式 ③三點式 ④二點式
- 【1】6.下列何者不是骨質疏鬆症易發生骨折之部位？  
①踝部 ②腕部 ③髖部 ④脊椎骨
- 【2】7.全髖關節置換患者出院之護理指導，下列何者錯誤？  
①兩腿不可交叉，雙膝保持分開 ②屈曲患部髖關節不可小於 90 度  
③勿坐低矮椅子，或軟而深的沙發椅 ④避免提重物、跑和跳，以防患部過度用力
- 【3】8.下列何者為低心輸出量症候群？  
①鹼中毒 ②尿量增加 ③肢端濕冷 ④脈搏壓增加
- 【1】9.長期服用嗎啡止痛，病人可能產生的副作用，下列何者錯誤？  
①水腫 ②便秘 ③噁心嘔吐 ④呼吸抑制
- 【1】10.下列何者是對於心律不整最重要的診斷工具？  
①心電圖 ②胸部 X 光 ③心導管檢查 ④心臟超音波掃描
- 【4】11.依據 Parkland 公式，燒傷病人最適合用何種溶液補充體液？  
① 5% Albumin ② 0.45% NaCl 溶液 ③ D5 water ④ Ringer's lactate
- 【3】12.有關高血壓服藥指導，下列何者不適當？  
①每日定時服藥 ②勿自行調整藥量 ③血壓穩定即可停藥 ④長時間持續服藥
- 【3】13.高血壓病人每日日常生活保健之指導，下列何者不適當？  
①戒菸 ②控制體重 ③臘肉鹹蛋不受限 ④每日至少 30 分鐘有氧運動
- 【2】14.有關第二型糖尿病的敘述，下列何者錯誤？  
①體內細胞無法正常運作使葡萄糖進入細胞 ② beta 細胞不能製造胰島素  
③症狀有喝多、尿多等 ④有基因和家族病史
- 【1】15.林小姐誤食入清潔用漂白水，送醫後即刻之處理措施，何者錯誤？  
①立即催吐 ②清洗被污染的皮膚  
③用牛奶灌入稀釋濃度 ④預防吸入性問題

- 【2】16.有關登革熱 (Dengue fever) 的敘述，下列何者正確？  
①登革熱的傳播途徑為接觸傳播  
②登革熱感染者在感染期若被病媒蚊叮咬，此蚊將感染登革病毒  
③臺灣主要傳播登革熱的病媒蚊為三斑家蚊及環紋家蚊  
④登革熱目前有可施打的疫苗，民眾可到衛生單位進行施打
- 【3】17.個案化學治療後血液的絕對嗜中性球 (ANC) 數目降為  $580/\text{mm}^3$ ，護理人員提供的照護中，何者錯誤？  
①個案與照顧者均須使用肥皂與水或酒精乾洗手液進行手部清潔  
②衛教個案與家屬，剛接受活性或減毒疫苗，或 6 週內接受活菌疫苗注射者，不得探視病人  
③建議攝取新鮮的食物，如生菜、生魚片等食物，以獲取充足的維生素與蛋白質  
④個人衛生方面，每日以軟毛牙刷刷牙、沐浴時使用溫和肥皂清潔身體
- 【2】18.有關醫護照護相關感染之敘述，下列何者正確？  
①因醫護人員的手而引起醫護照護相關感染的病菌以大腸桿菌為最多  
②抗生素的誤用與濫用是引起醫護照護相關感染的重要因素之一  
③血流感染是醫護照護相關感染的常見類別，判定依據為血液培養的結果每 ml 血液 > 100000 個菌落  
④醫護照護相關感染的發生場所僅限於發生在醫院，不包含其他如長照機構、居家照護及門診發生的感染
- 【2】19.護理師為個案觸診淋巴結時，若出現以下何種特徵顯示可能有異常？  
①摸不到淋巴結 ②摸到有壓痛感、不規則、硬而固定的結節  
③摸到柔軟、無壓痛的結節 ④摸到直徑約 0.5 公分、可動性的結節
- 【1】20.個案主訴右側腹痛，護理師以手指壓迫個案腹部左下象限時，個案表示右下腹疼痛，且當手指迅速抽離時，再度引起右下腹呈現放射性反彈痛。此學理檢查結果是為下列何項？  
①洛夫辛氏徵象(Rovsing's sign)陽性反應 ②普氏徵象(Psoas sign)陽性反應  
③閉孔肌徵象(Obturator sign)陽性反應 ④麥氏徵象(McBurney's sign)陽性反應
- 【1】21.有關壓瘡的形成，下列敘述何者正確？  
①剪力是造成深層組織壓瘡的主要原因  
②短時間承受強大的壓力較長時間承受較小的壓力，更容易形成壓瘡  
③體內維生素 A 的缺乏，會使微血管脆性增加，容易形成壓瘡  
④肥胖的個案，有大量脂肪承受壓力，不容易發生壓瘡
- 【2】22.個案的壓瘡表皮以及部分真皮破損，傷口底部發亮潮濕，沒有腐肉，有關護理師的評估與護理措施，下列何者正確？  
①個案是壓瘡第三期  
②使用無菌生理食鹽水清洗傷口以及保持清潔，必要時覆蓋膜性敷料保護傷口  
③應以肥皂徹底清潔個案身體以及壓瘡處皮膚，避免汗水或排泄物接觸皮膚  
④為促進傷口癒合，此個案應進行擴創手術
- 【2】23.個案表示由臥姿突然改為站立時，感到頭昏、視力模糊、虛弱，護理人員先測量其躺臥時的血壓，和站立後兩分鐘的血壓，下列何種情形顯示個案有姿態性低血壓？  
①站姿的收縮壓與躺臥時的收縮壓相同  
②站姿的收縮壓比躺臥時的收縮壓下降 20 毫米汞柱以上  
③站姿的舒張壓與躺臥時的舒張壓相同  
④站姿的舒張壓比躺臥時的舒張壓上升 10 毫米汞柱以上
- 【2】24.有關睡眠快速動眼期(REM)及非快速動眼期(NREM)的說明，下列敘述何者正確？  
①長時間待有加護病房的個案，REM 睡眠周期變長，所以經常沉睡  
②老年人的睡眠總時數以及 NREM 的睡眠減少  
③規律運動會增加 REM 周期，可促進睡眠時的放鬆  
④服用抗憂鬱劑會延長入睡時間及 REM 周期，易陷入沉睡
- 【4】25.個案預備接受大腸鏡檢查，醫囑開立採清流質飲食(clear liquid diet)，護理師應教衛教個案可以攝取下列何種類食物？  
①豆腐、蒸蛋 ②豆花、布丁 ③果汁、豆漿 ④過濾的果汁、去油的肉湯
- 【2】26.個案因膽結石產生膽囊炎，行腹腔鏡膽囊切除術後 T 型引流管留置，下列敘述何者正確？  
①給予嗎啡以控制疼痛，以免加重 Oddi 氏括約肌痙攣  
②可塗抹凡士林、氧化鋅等藥物，保護 T 型管周圍皮膚  
③為避免腹壓過大，術後應盡量採取躺臥姿勢並絕對臥床休息  
④引流液顏色會由棕綠色膽汁轉為血性引流液

【請接續背面】

【1】27.個案因罹患急性膽囊炎，護理師應建議個案於急性期緩解後採何種飲食？

- ①低脂、低膽固醇飲食
- ②低普林飲食
- ③低渣飲食
- ④限制含鉀高的飲食

【3】28.個案發生急性、嚴重的心絞痛，血壓高達 220/120mmHg，以急診五級檢傷分類屬於第二級，有關第二級的說明，下列何者正確？

- ①屬於緊急等級，病況可能持續惡化，需要急診處置，可能伴隨明顯不適的症狀影響日常活動
- ②屬於復甦急救等級，生命或肢體需要立即處理
- ③屬於危急等級，潛在性危及生命、肢體以及器官功能狀況，需快速控制與處置
- ④屬於次緊急等級，病況可能和年齡疲憊或某些疾病之合併症相關，需要做處置，以求恢復，避免惡化

【3】29.一位孕婦吃吐司發生哽塞，護理人員以哈姆立克法救助個案，下列措施何者正確？

- ①協助孕婦側臥，以食指深入孕婦的嘴裡，嘗試挖出異物
- ②以掌心在孕婦的背部中心用力拍擊五下，再以食指及中指在乳頭連線中心用力按壓五次
- ③站在孕婦背後，雙手穿過病人腋下，將手放在病人劍突以上 2 公分的胸骨，快速由外向內施壓推擠
- ④站在孕婦背後，雙手穿過病人腋下，將手放在病人劍突與肚臍之間，快速由外向內施壓推擠

【2】30.處理大量傷患事故，最常用的檢傷分類法為「START」(Simple Triage And Rapid Treatment)。以顏色區分病患的嚴重度以作為救治優先順序，下列敘述何者正確？

- ①第一優先：黑色或白色
- ②第二優先：黃色
- ③第三優先：紅色
- ④最不優先：綠色

【4】31.下列何者不是傷口縫線拆線時間的決定因素之一？

- ①傷口的位置
- ②傷口的血管供應
- ③傷口的張力
- ④傷口有無使用敷料

【4】32.當心臟血管缺血產生胸悶、胸痛時，採取 MONA 治療，有關 MONA 的敘述，下列何者錯誤？

- ① M：是指 Morphine，用以緩解疼痛以及降低心肌負荷與耗氧
- ② O：是指 Oxygen，提供氧氣供應
- ③ N：是指 NTG，降低心臟前後負荷，擴張冠狀動脈
- ④ A：是指 Adalat，降低血壓，降低心臟後負荷

【2】33.有關 AED 的使用注意事項，下列何者錯誤？

- ①被施救者身上有金屬項鍊時，宜先移除後再以 AED 電擊
- ②裝有心臟節律器的患者不可以使用 AED 電擊
- ③ AED 的貼片位置，應依指示在病患胸前的右上以及左下貼上電極片
- ④ AED 會自動判讀心電圖，一旦偵測到無脈搏的 VT/VF 時才會開啟電擊功能

【3】34.有關血鉀過低的處置方式，下列敘述何者錯誤？

- ①增加鉀的攝取，如柑橘、新鮮蔬果及肉類
- ②口服鉀鹽藥物
- ③每日肌肉注射 15%KCL 3~5ml
- ④15%KCL 10ml 加入 500ml 的 0.9%氯化鈉溶液緩慢靜脈滴注

【2】35.個案有蛋白尿且腎絲球過濾率(Estimated GFR,e-GFR)為 68 ml/min/1.73m<sup>2</sup>，其是屬於慢性腎臟病五個分期的何種階段？

- ①第一期
- ②第二期
- ③第三期
- ④第四期

【1】36.前列腺肥大個案行尿道前列腺切除術，術後三路導尿管留存，進行生理食鹽水沖洗清除血塊，病人主訴膀胱脹痛，下列何者為首要的護理措施？

- ①評估三路導尿管的通暢度，去除造成阻塞的原因
- ②衛教個案這是術後的正常反應，請個案不要擔心，先行忍耐
- ③立刻請醫師開立醫囑給予止痛劑
- ④加快沖洗的速度以預防阻塞

【3】37.衛教民眾乳房自我檢查的內容，下列何者錯誤？

- ①一般婦女應於月經來潮的第 7~10 天施行自我檢查
- ②停經或更年期的婦女應每個月固定某一天施行自我檢查
- ③檢查時用食指指尖來檢查，因為指尖是對觸覺最敏感的部份
- ④應於沐浴、平躺於床上、及站立於鏡子面前之三個情境下施行自我檢查

【4】38.王小明 10 歲男孩，身高 138 公分，體重 55 公斤，以他的 BMI 而言，其體重屬於下列何種情況？

- ①過輕
- ②適中
- ③過重
- ④肥胖

【1】39.依勞工健康保護規則規定，事業單位之同一工作場所，勞工人數為 400 人，工作性質為一般作業，無特別危害健康作業，應僱用專任護理人員幾人？

- ① 1 人
- ② 2 人
- ③ 3 人
- ④ 4 人

【3】40.個案接受輸液治療，主訴靜脈注射部位處有腫脹、疼痛，點滴速度變慢的情形，護理人員應執行的處置，下列何者錯誤？

- ①將點滴瓶放到低於針頭位置檢視有無回血
- ②檢查注射部位是否腫脹、冰冷
- ③立刻將針頭拔出
- ④檢查留置針針座固定時的高度是否未與血管平行

【1】41.李小姐想要捐血，詢問有關捐血量以及捐血間隔，下列說明何者正確？

- ①每次捐血以 250ml 為原則，但體重 60 公斤以上者，每次捐血得為 500ml
- ②每次捐血 250ml 者，捐血間隔應為 1 個月以上
- ③每次捐血 500ml 者，捐血間隔應為 2 個月以上
- ④男性年捐血量應在 2000ml 以內，女性年捐血量應在 1500ml 以內

【1】42.有關給藥的方法，下列敘述何者正確？

- ①降血鉀藥物(kalimate)需先溶解於 30~50cc 溫水後服用
- ②止吐劑與整腸劑應於飯後服藥效果較好
- ③眼藥水應滴在角膜上
- ④腸衣錠使用時應磨成粉末狀，細小分子有助吸收

【2】43.個案接受同步放射及化學治療(concurrent chemoradiotherapy；CCRT)，放射線治療部位發生皮膚炎，下列衛教內容何者錯誤？

- ①照射部位易有色素沉著，於治療療程結束後通常可慢慢恢復
- ②在進行放射線治療前應在照射部位輕輕塗抹凡士林以保護皮膚
- ③有滲出液的濕性脫屑皮膚時，可以無菌生理食鹽水清潔及避免感染
- ④放射線照射部位應避免穿著過緊的衣服，以避免摩擦，衣服也盡量以寬鬆、棉質材質為宜

【1】44.有關癌症個案的慢性疼痛處理原則，下列敘述何者正確？

- ①個案即使沒有疼痛仍應按時間給止痛藥
- ②長期、穩定的疼痛控制以 Meperide 為首選
- ③以 Fentanyl 皮膚貼片止痛，應每 12 小時更換一片
- ④為有效緩解個案的疼痛，給藥途徑應以靜脈給藥為首選

【4】45.高血壓是指收縮壓持續升高超過多少 mmHg?

- ①110
- ②120
- ③130
- ④140

【1】46.有關邊緣性人格異常的特徵，下列敘述何者正確？

- ①在社交方面出現不穩定與緊張的人際關係
- ②相信自己是特別且獨一無二的，過度需要他人的讚美
- ③樂觀、精力充沛、易於融入群體生活
- ④過分專注紀律、完美主義及人際關係之掌控，缺乏彈性、開放性的行為

【2】47.個案 76 歲，家人發現近幾個月有經常遺失物品、煮東西忘記關瓦斯、晚上睡不著覺，起來走來走去等情形，情緒起伏大、易怒，醫師診斷為阿茲海默氏症患者，下列照護措施何者錯誤？

- ①建議家屬使用安心手鍊防走失
- ②當個案發脾氣暴怒時約束個案，例：將其反鎖在房間，防止其傷人傷己
- ③提升家電使用的安全性，如關掉瓦斯總開關或安裝瓦斯安全開關
- ④鼓勵個案依體力參與日常活動，建立正常日常作息，促進夜眠品質

【3】48.依據「勞工健康保護規則」，雇主對在職勞工需定期實施健康檢查，針對 40 歲以上未滿 65 歲的勞工，應幾年檢查一次？

- ①每 1 年 1 次
- ②每 2 年 1 次
- ③每 3 年 1 次
- ④每 5 年 1 次

【1】49.若要了解某公司「目前罹患高血壓的員工人數，其佔公司所有員工的百分比」，護理人員應該要測量下列何項指標？

- ①盛行率(prevalence)
- ②致死率(case-fatality)
- ③累積發生率(cumulative incidence)
- ④勝算比(odds ratio)

【3】50.針對工作環境有化學品暴露的勞工，施行特殊健康檢查結果為必需實施治療，依據健康檢查分級管理，其應屬於第幾級管理？

- ①第一級
- ②第二級
- ③第三級
- ④第四級