

111年第二次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段考試、營養師、護理師、
社會工作師考試、111年專門職業及技術人員高等考試法醫師、語言治療師、聽力師、
牙體技術師、公共衛生師考試、高等暨普通考試驗光人員考試試題

等 別：高等考試

類 科：護理師

科 目：產兒科護理學

考試時間：1 小時

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當答案。

(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 有關懷孕期正常內分泌變化的敘述，下列何者正確？
(A)腦下垂體前葉分泌濾泡刺激素及黃體生成素會增加
(B)甲狀腺所分泌的甲狀腺素會增加
(C)腎上腺分泌留鹽激素會降低
(D)胎盤分泌的雌二醇分泌增加取代卵巢分泌的雌三醇
- 阮女士，目前懷孕 30 週，飲食偏好辣與冷食，公婆一直抱怨這樣飲食型態對孩子健康不好，下列護理處置，何者較不適當？
(A)評估孕婦的飲食嗜好及行為
(B)尊重接受孕婦的看法採不批評的態度
(C)認同公婆想法，一起說服其改變不健康的飲食
(D)尊重孕婦最後的信念與決定
- 有關周產期死亡率的定義，下列何者正確？
(A)妊娠 20 週以上之死胎數及出生 1 週內的嬰兒死亡數 ÷ 一年中活產數×1000
(B)妊娠 28 週以上之死胎數及出生 1 週內的嬰兒死亡數 ÷ 一年中活產數×1000
(C)妊娠 28 週以上之死胎數 ÷ 一年中活產數×1000
(D)妊娠 24 週以上之死胎數 ÷ 一年中活產數×1000
- 王女士，懷孕 10 週，有關雌性素 (estrogen) 增加而發生的子宮頸變化，下列何者錯誤？
(A)子宮頸血管增生充血
(B)子宮頸黏液分泌增加
(C)子宮頸組織變肥厚堅硬
(D)子宮頸腺體增加腫脹
- 李女士，懷孕 11 週，第一胎為唐氏症，此胎希望可以提前檢查確診，下列何者為此時較適當的檢查？
(A)胎兒頸部透明帶 (B)絨毛膜取樣術 (C)羊膜腔穿刺術 (D)唐氏症母血檢驗
- 李女士，懷孕 40 週尚無產兆，前來進行 30 分鐘的無壓力試驗，有關無壓力試驗判讀所需的資料，下列何者錯誤？
(A)宮縮時胎心率出現至少 15 秒的加速 (B)胎心率的變異性介於 3~6 次/分鐘
(C)前 10 分鐘無胎動，後 10 分鐘 5 次胎動 (D)胎心率加速通常介於 12~15 次/分鐘
- 有關我國全民健康保險給付之產前檢查時間，一般孕婦常規接受妊娠糖尿病篩檢的週數為何？
(A) 18~20 週 (B) 24~28 週 (C) 30~34 週 (D) 35~37 週
- 有關懷孕期間血液系統的變化，下列敘述何者錯誤？
(A)血漿量比未懷孕時增加 (B)血比容比未懷孕時降低
(C)纖維蛋白原數目比未懷孕時增加 (D)血小板數目比未懷孕時增加
- 懷孕 24 週婦女，孕前 BMI 為 23，目前體重比孕前增加 5 公斤，血色素 (Hb) = 11.2 g/dL，血比容 (Hct) = 35%，目前飲食指導內容，下列何者除外？
(A)每日熱量攝取量較孕前增加 300 卡 (B)每日額外增加鐵劑攝取量 45 mg
(C)每日增加蛋白質攝取量 10 g (D)需攝取足夠含鈣質食物

- 10 妊娠 36 週時，腹部四段式觸診觸得胎位是 LOA，則評估胎心音時，超音波胎音器（doppler）應放在何處，會聽得最清楚？
- (A)肚臍周圍 (B)左側肚臍、髖骨前上棘延長線
(C)右側肚臍與髖骨前上棘連線的中點 (D)左側肚臍與髖骨前上棘連線的中點
- 11 陳女士，產後 1 小時後評估發現其子宮位置於臍上 2 指且偏向右側，其最有可能的原因為何？
- (A)子宮內胎盤殘留 (B)子宮內積血 (C)子宮收縮不佳 (D)膀胱漲滿
- 12 王女士，29 歲，G₁P₀，40 週。目前子宮頸擴張 4 公分，子宮收縮強度達 50 mmHg，可自在與護理師交談，下列護理處置何者不適當？
- (A)提供呼吸技巧的訓練及舒適措施指導 (B)每 30 分鐘陰道內診一次，以監測產程進展
(C)協助經常改變姿勢促進舒適與放鬆 (D)每 2 小時提醒待產婦解小便排空膀胱
- 13 王女士，G₁P₀，懷孕 24 週，常規的產前檢查正常。詢問護理師：「我有時會覺得肚子繃緊，但不覺得痛。繃緊感有時候幾秒鐘就過去，通常不超過 1 分鐘，沒有其他不舒服，這樣是正常嗎？」下列的回答，何者最適當？
- (A)這可能是早產的徵兆，需要立即通知醫師，可能需要住院安胎
(B)雖然目前沒事，但妳可能是早產的高危險群，需要多臥床休息
(C)這種收縮對子宮頸變薄有幫助，妳的身體開始生產前的準備，不用擔心
(D)這是懷孕期間一種正常的無痛性子宮收縮，無需太擔心
- 14 有關胎兒娩出的過程，當左枕前位（LOA）的胎兒完成內回轉（internal rotation）。此時胎頭與母體骨盆間的關係，下列敘述何者正確？
- (A)胎頭的矢狀縫合與母體骨盆的前後徑，呈平行狀態
(B)胎頭的冠狀縫合與母體骨盆的前後徑，呈平行狀態
(C)胎頭的額縫合與母體骨盆的前後徑，呈垂直狀態
(D)胎頭的枕下前凶徑與母體骨盆的前後徑，呈垂直狀態
- 15 根據世界衛生組織（WHO）對無併發症或任何健康問題婦女的待產期照護建議，下列何者正確？
- (A)採間歇性胎心音聽診監測 (B)例行性灌腸及陰毛剃除
(C)產程活動期開始禁食 (D)常規性施打點滴
- 16 王女士，G₁P₀，子宮頸口開 10 公分，待產時宮縮疼痛，下列措施何者最適當？
- (A)直接送入分娩室，等醫師來方可用力生產
(B)可採膀胱截石臥位，此為最有助於產程進展之姿勢
(C)當進入第二產程每 30 分鐘監測待產婦的血壓、脈搏和呼吸
(D)有強烈便意感時，可採緩慢開聲門用力生產
- 17 使用催產素催生的待產婦女，當發生下列何種情況仍可持續使用催產素促進產程？
- (A)胎頭與骨盆不對稱 (B)胎兒窘迫
(C)前置胎盤 (D)早期破水
- 18 一位足月懷孕的孕婦，因腹痛來院準備待產，護理師評估其疼痛的性質：子宮收縮壓力在 40 mmHg，收縮的頻率不規則，子宮頸沒有變化，疼痛與不適的部位侷限在腹部，協助來回走動時其疼痛可減輕，該產婦的子宮收縮是屬於那一種陣痛？
- (A)真陣痛 (B)假陣痛
(C)混合型陣痛 (D)無法分辨陣痛型態
- 19 有關新生兒蒙古斑的敘述，下列何者錯誤？
- (A)為新生兒胎記的一種 (B)多分布於臀部、背部和大腿
(C)一般於 12~18 歲會逐漸消失 (D)邊緣界線不明顯

- 20 產後第二天純母乳哺餵的母親詢問：「我的寶寶兩餐之間是否需要餵開水？」下列護理指導何者最適當？
(A) 6 天內的純母乳寶寶都需要餵開水，避免導致結晶尿
(B) 6 天內的純母乳寶寶都需要餵少量開水，避免鵝口瘡
(C) 6 個月內的純母乳寶寶皆需要餵開水，避免便秘
(D) 6 個月內的純母乳寶寶皆不需要餵開水，避免增加腎臟負荷
- 21 有關產後生命徵象的評估，下列何者正確？
(A) 產後心輸出量增加，不易發生姿位性低血壓
(B) 產後心輸出量增加，最初 6~10 天常發生心跳過緩
(C) 會陰傷口痛、子宮收縮痛，使呼吸速率下降
(D) 分娩時用力與脫水，會導致體溫升高至 39 °C
- 22 有關泌乳機轉的敘述，下列何者正確？
(A) 乳汁的移出與吸吮次數會影響泌乳量
(B) 吸吮刺激腦下垂體前葉分泌催產素
(C) 泌乳素可作用於肌皮細胞產生排乳反射
(D) 泌乳素夜間分泌較少，母親夜間應有充足睡眠以利奶水分泌
- 23 有關各種避孕方法作用原理的敘述，下列何者正確？
(A) 迷你丸使子宮內膜產生炎症反應而干擾受精卵著床
(B) 子宮內避孕器使子宮頸黏液變黏稠而產生避孕效果
(C) 避孕貼片使子宮內膜產生前列腺素化學物質而干擾受精卵著床
(D) 陰道避孕環可抑制排卵，使子宮頸黏液變黏稠而產生避孕效果
- 24 有關產後子宮復舊 (uterine involution)，下列敘述何者正確？
(A) 子宮底每天下降一指寬，約產後 5 天降至骨盆腔
(B) 除胎盤位置外，子宮內膜復舊約需 6 週
(C) 蛋白質自體溶解使子宮細胞數目減少而復舊
(D) 胎盤部位是由剝落過程而復舊，所以沒有疤痕形成
- 25 吳女士，G₁P₁，產後第三天，計畫採純母乳哺育，詢問：「哺乳是否可以避孕？」下列護理指導何者最適當？
(A) 在月經尚未出現之前，不分日夜純母乳哺餵，頻率 8~10 次以上，6 個月內可當作避孕措施
(B) 分娩後 42 天可能排卵，哺乳避孕只適用於產後 1 個月內
(C) 哺乳可以抑制排卵，只要純母乳哺餵，月經未恢復即可避孕
(D) 純母乳哺餵是最不安全的避孕方式，不建議產後 6 個月內使用
- 26 齊女士，月經週期規律，擬以安全期法避孕，下列護理師的指導何者正確？
(A) 瞭解齊女士記憶中的最長及最短週期
(B) 最長月經週期減 10，最短月經週期減 18
(C) 卵子排卵後可存活 48~72 小時
(D) 避孕效果約 80%
- 27 有關剖腹產後陰道生產 (vaginal birth after cesarean, VBAC) 的敘述，下列何者正確？
(A) 前胎剖腹生產的次數，不影響 VBAC
(B) 前置胎盤者，可以建議行 VBAC
(C) 前胎採子宮下段橫切剖腹產，此胎不宜行 VBAC
(D) 曾有子宮破裂病史者，此胎不宜行 VBAC
- 28 有關新生兒臍帶的照護措施，下列何者不適當？
(A) 出生 24~48 小時應去除臍夾避免局部壓迫性傷害
(B) 將尿布反摺避免覆蓋臍帶可促進乾燥與預防感染
(C) 若使用酒精消毒臍根部應以環狀向外消毒直徑約 5 公分
(D) 酒精性優碘亦可使用於臍帶消毒且乾燥效果較酒精為佳

- 29 下列何項為新生兒晚期飢餓的暗示行為 (late hunger cues) ?
(A)吸吮嘴唇 (B)不斷哭泣 (C)將手放進嘴巴 (D)嘴唇出現尋乳動作
- 30 下列何項不是新生兒於睡眠活動週期中「安靜清醒期」(quiet alert state)的行為表徵?
(A)注意周圍環境 (B)眼睛張大、明亮、有精神
(C)對照顧者有反應 (D)呼吸不規律
- 31 有關妊娠合併糖尿病孕婦預後及其相關檢測的敘述，下列何者正確？
(A)產後血糖值檢測仍超過標準值者，未來一定會罹患第一型糖尿病
(B)具第二型糖尿病的危險因子，下胎懷孕即在第一次產檢就須進行篩檢
(C)產後血糖值檢測正常者，在產後 6~12 週就不需再做糖尿病篩檢
(D)妊娠期糖尿病與卵巢分泌雌性素有關係，與下一胎再度罹患糖尿病的關聯性高
- 32 有關孕婦前置胎盤的症狀敘述，下列何者錯誤？
(A)腹部較少疼痛表現 (B)常合併有胎位不正的現象
(C)腹部呈現木板狀的堅硬 (D)突發性鮮紅色陰道出血
- 33 臍帶血中可作為胎兒在子宮內感染診斷之免疫球蛋白，下列何者正確？
(A) IgA (B) IgE (C) IgG (D) IgM
- 34 王女士，G₁P₀，過去產檢皆正常，於妊娠 32 週產檢時主訴胎動有減少情形，感到很擔心，此時何項處置最適當？
(A)指導個案返家記錄每日胎動 (B)此為此期常見情形，告知不用擔心
(C)安排無壓力試驗 (D)立即安排引產
- 35 有關我國後天免疫缺乏症候群母嬰的照護，下列何者錯誤？①產婦的排泄物以漂白水浸泡 1 小時後再沖入馬桶 ②新生兒出生 7 天後即給予預防性投藥 ③可以採取親子同室 ④應鼓勵餵母乳以促進親子關係
(A)①② (B)②③ (C)②④ (D)③④
- 36 有關更年期熱潮紅症狀的敘述，下列何者錯誤？
(A)與黃體素的減少有關 (B)起因於血管舒張與收縮之間不穩定
(C)藉由流汗、發熱來降低體溫 (D)體重過輕者，熱潮紅症狀更為嚴重
- 37 女性於經期不適時建議可補充的維生素為何？
(A)維生素 A (B)維生素 D (C)維生素 E (D)維生素 C
- 38 有關精液檢查的敘述，下列何者錯誤？
(A)檢查前 3~5 天需禁慾 (B)自慰射精並以保險套方式收集精液
(C)精液收集完成後保存於室溫環境中 (D)1~2 小時內送至醫院檢查
- 39 劉女士，28 歲，因外陰部搔癢、排尿時有灼熱感並有濃稠白色的陰道分泌物，內診時可見陰道壁有乳酪狀白色附著物，最有可能是下列何種病原感染？
(A)砂眼披衣菌 (B)白色念珠球菌 (C)梅毒螺旋體 (D)陰道鞭毛滴蟲
- 40 有關乳癌的護理措施，下列何者正確？
(A)術後患側手臂易發生腫脹感染，會自然恢復
(B)術後以 PQRST 評估患者疼痛，其中 R 是 recovery，評估疼痛恢復的狀況
(C)外出時，盡量避免陽光直射患側手臂
(D)術後腋下會出現僵硬、緊繃的感覺是正常的，會慢慢恢復，不需特別注意
- 41 依據美國燒傷協會有關兒童重度燒燙傷程度的分類，下列敘述何者正確？
(A)二度燒燙傷占 10~20% 體表面積 (B)二度燒燙傷占 <10% 體表面積
(C)三度燒燙傷占 2~10% 體表面積 (D)三度燒燙傷占 >10% 體表面積

- 42 有關自閉症兒童的敘述，下列何者護理照護較為正確？
(A)低功能自閉症兒童語言表達與理解能力通常正常
(B)有自傷行為的自閉兒，必要時可執行適當的約束
(C)增加身體的碰觸可刺激自閉症兒童的感覺統合
(D)經常改變生活環境可增加自閉症兒童的學習刺激
- 43 玲玲，2 歲 12 公斤，媽媽自己開車載她看醫生，玲玲乘坐汽車的方式，下列何者正確？
(A)坐嬰兒安全座椅，置前座，面向車尾
(B)坐幼兒安全座椅，置後座，面向車頭
(C)坐幼兒安全座椅，置前座，面向車頭
(D)坐嬰兒安全座椅，置後座，面向車尾
- 44 小奇，2 個月大，在吃奶時，突然沒有呼吸、心跳，且嘴唇發紫，保母立即施以心肺復甦術，下列步驟何者錯誤？
(A)刺激腳跟以評估意識狀態
(B)以 10 秒內檢查肱動脈
(C)心外按摩部位於胸部兩乳頭連線中央下方
(D)以單手掌根方式進行心外按摩
- 45 兒童誤食下列那種毒物時，可採用催吐處理？
(A)清潔劑
(B)鐵劑
(C)漂白劑
(D)洗碗劑
- 46 丁丁，3 歲，被家中養的母貓咬傷手背，傷口流血，疼痛哭泣，送至急診處理，下列處置何者錯誤？
(A)儘快打破傷風抗毒素
(B)沖洗傷口，予抗生素藥膏局部塗抹
(C)指導家長，傷口若發生紅腫須趕快就醫
(D)指導家長回家應注意體溫及局部淋巴腫脹
- 47 小玲，8 歲，住院期間常抱怨因右手打點滴無法自己吃飯及畫畫、不願意打針及吃藥，護理師協助小玲增進其「自我控制感」的護理措施，下列敘述何者最適當？
(A)讓小玲表達及討論可以參與治療的方式
(B)在小玲的同意下讓小玲的同學來院陪伴
(C)跟小玲聊聊她喜歡的卡通以轉移注意力
(D)請小玲的主要照顧者留在病房內陪伴
- 48 有關執行兒童生命徵象的測量，下列敘述何者錯誤？
(A)幼兒生命徵象測量依序是呼吸、脈搏、體溫和血壓
(B)呼吸暫停是新生兒常見表徵，僅需持續觀察和記錄
(C)2 歲以下幼兒，需測量心尖脈脈動完整 1 分鐘
(D)3 歲以下幼兒，測量耳溫時將耳朵向下向後拉
- 49 有關兒童疼痛的處理，下列何者最不適當？
(A)使用鴉片類藥物，會合併給予緩瀉藥物以預防合併症發生
(B)讀故事書是一種分散注意力法，可運用於 6 歲以上的小孩
(C)EMLA 是一種局部麻醉劑，需於侵入性治療前 1 小時使用
(D)Acetaminophen 是一種非類固醇抗發炎藥物，適合輕度疼痛
- 50 小明，4 歲半，入院須接受疝氣手術治療，下列那項護理措施較不適當？
(A)使用臉譜量表來評估小明術前、術後的疼痛程度
(B)向小明解說開刀過程，應避免使用「切除」、「切開」等字眼來說明
(C)注射後用膠布覆蓋注射部位，其目的是要轉移注意力，減輕疼痛
(D)運用遊戲方式，如：角色扮演等，來表達術前、術後疼痛感受
- 51 有關兒童遊戲發展的敘述，下列何者錯誤？
(A)嬰兒期正發展單獨遊戲，如玩填充玩偶
(B)幼兒期主要發展平行遊戲，如和鄰居一起玩耍，但各玩各的
(C)合作性遊戲是學齡期的特色，如下棋、玩撲克牌
(D)聯合遊戲是青春期的特色，如玩家家酒

- 52 生理徵象的改變為評估疼痛的重要指標之一，下列何種徵象與疼痛較無直接關係？
(A)尿量 (B)心跳 (C)呼吸 (D)瞳孔
- 53 有關早產兒安全的擺位，下列敘述何者不適當？
(A)口胃管灌食後，維持頭部抬高 45 度約 10 分鐘
(B)休息時，可肩膀朝前，雙手屈曲朝向身體中線並靠近嘴巴
(C)平時，屈曲髖部及膝蓋，預留四肢活動的空間
(D)若出現呼吸暫停，可頸部微仰，勿過度屈曲與伸展
- 54 早產兒若氧氣濃度超過 60%， $\text{PaO}_2 < 60 \text{ mmHg}$ 時，醫囑使用持續性氣道正壓呼吸 (CPAP)，下列敘述何者不適當？
(A)適用於可自行呼吸之呼吸窘迫症候群早產兒
(B)給予 4~7 cmH_2O 壓力
(C)可增加早產兒肺功能性肺餘容積
(D)防止吸氣時肺泡塌陷
- 55 對於高胱胺酸尿症 (homocystinuria, HCU) 兒童的長期照護，下列何者錯誤？
(A)禁食母乳，採用豆類配方之特殊奶粉 (如 3200-K)
(B)對於維生素 B6 反應不佳的兒童，需限制含甲硫胺酸食物
(C)建議按時接受體格與智力發育評估
(D)早期發現早期治療可以避免近視、水晶體脫垂等眼睛病變
- 56 小文，2 歲 6 個月，罹患慢性病長達一年，下列有關其壓力反應之敘述，何者最適當？
(A)身體心像改變 (B)自主感的建立 (C)性別角色的建立 (D)社交隔離的困擾
- 57 小華，5 歲，因其 3 歲弟弟罹患慢性疾病，需反覆長期住院，下列何者較不是造成小華壓力反應的風險因子？
(A)小華的性別
(B)發病前小華與弟弟或父母關係不良
(C)父母親情緒或行為大幅改變
(D)害怕會被送到其他地方接受照顧
- 58 安安，9 歲，因白血病復發病況惡化，常主訴身體疼痛，下列處置何者較不適當？
(A)告訴安安不要焦慮，要放輕鬆，帶她去遊戲室轉移心情
(B)使用安安可理解的語言與方式，以了解其身體不適的心情
(C)評估安安的疼痛程度、疼痛性質、疼痛持續時間及範圍
(D)協助安安採取舒適臥位，依醫囑給予止痛藥並監測成效
- 59 有關兒童罹患後天免疫缺乏症候群 (acquired immune deficiency syndrome) 的敘述，下列何者不適當？
(A)病毒會侵犯輔助 T 細胞，造成兒童後天的免疫缺乏
(B)間質性肺炎是愛滋病兒童最常見的臨床症狀
(C)兒童感染愛滋病毒的潛伏期較成人長
(D)愛滋病兒童大多是生產時經產道接觸到母親的血液和分泌物而致病
- 60 小乖，18 個月大，因感染腸病毒上吐下瀉多日而入院，原體重為 14kg，入院時體重只有 12kg，皮膚黏膜乾燥、脈搏淺快、尿很少，其症狀屬於：
(A)輕度脫水 (B)中度脫水 (C)重度脫水 (D)正常體液流失
- 61 有關呼吸道融合病毒 (Respiratory Syncytial Virus, RSV) 的敘述，下列何者錯誤？
(A)是一種罕見病毒，罹患 RSV 嬰幼兒通常會低血氧及肺擴張不全
(B)吸入性抗病毒藥物利巴韋林 (Ribavirin) 可用於治療 RSV
(C)使用 RSV 免疫球蛋白，預防高危險嬰兒感染 RSV 的風險
(D)RSV 可引起呼吸窘迫和肺炎，因此需入院治療

- 62 有關罹患呼吸系統疾病兒童接受胸腔物理治療之敘述，下列何者最適當？
(A)胸腔物理治療包括呼吸運動（breathing exercise）及呼吸肌訓練
(B)為利排痰，最有效的方法為胸部叩擊後接著給予噴霧治療
(C)飯前及飯後 1 小時，是進行胸腔物理治療的最佳時間
(D)當肺部的上、下葉皆須引流時，應以下葉為優先
- 63 關於兒童罹患黴漿菌性肺炎（mycoplasma pneumonia）照護措施之敘述，下列何者最適當？
(A)告知家屬該肺炎的傳染性低，不用擔心會有家人間的傳染
(B)提醒家屬注意兒童常會出現高燒、痰液量多及胸肋膜疼痛的症狀
(C)指導家屬由於黴漿菌喜侵犯肺泡及細支氣管，故病程進展是突發且快速
(D)跟家屬說明以 Azithromycin 治療，療程短且副作用較少
- 64 小真，6 個月大，體重 7 公斤，剛接受完開心手術入住心臟外科加護病房，有關腎臟衰竭之臨床表徵，下列何者錯誤？
(A) 1 小時內尿量排出 0.5~2 mL/kg/hr
(B)意識不清或昏睡
(C)高血鉀出現心悸現象
(D)血中尿素氮和血清肌酸酐降低
- 65 有關早產兒開放性動脈導管的醫療處置，下列敘述何者錯誤？
(A)沒有症狀者，可於 12 週內自動關閉
(B)給予前列腺素 E₁(PGE₁)是優先的治療方式
(C)出生體重低於 1000 g 有心衰竭症狀，宜提早作結紮手術
(D)可在左側第二肋間聽到連續性的心雜音，成長至幼兒時期，若導管仍未關閉，通常會先考慮導管栓塞術
- 66 為了增加法洛氏四重症（TOF）兒童的肺循環血流，以增加其左心充氧血的含量，下列照護處置何者錯誤？
(A)缺氧發作時予膝胸臥姿
(B)口服給予 Aspirin
(C)靜脈滴注前列腺素 E₁(PGE₁)
(D)布萊洛克陶西分流術（Blalock-Taussing shunt）
- 67 小蘋，5 歲，診斷為缺鐵性貧血，血紅素（Hb）為 5.5 g/dL，下列何項身體反應與此檢驗值最不相關？
(A)常出現發燒症狀
(B)休息時，心跳 100~120 次/分鐘
(C)注意力不集中
(D)生長發展遲緩
- 68 有關肌肉注射鐵劑時的注意事項，下列敘述何者錯誤？
(A)採 Z 字型深部肌肉注射
(B)抽藥之後需要更換針頭
(C)搓揉注射部位以利吸收
(D)注射後應停 5 秒再拔針
- 69 有關腸病毒的預防與環境消毒，下列何者正確？
(A)利用 75% 的酒精消毒玩具可預防腸病毒感染
(B)接觸腸病毒幼童，可口服 3 天巨環黴素預防性投藥
(C)兒童的分泌物或排泄物污染的物品建議使用 1,000 ppm 的含氯漂白水消毒
(D)冷凍可殺滅腸病毒
- 70 小芬，11 個月大，初次診斷為單純性熱性痙攣（simple febrile convulsion）住院治療，下列護理措施何者錯誤？
(A)發作時協助採側臥，維持呼吸道通暢
(B)教導家屬終生服用抗痙攣藥物的重要性
(C)提供床欄護墊使用
(D)通常停止發燒 10 天後，才執行腦電波檢查
- 71 花花，3 歲，罹患癌症需住院接受化學藥物治療。目前血液檢查結果為：白血球：1,200/mm³，其中多形核白血球（segmented neutrophil）：11%、帶狀白血球（band neutrophil）：1%、單核球（monocyte）：2%、淋巴球（lymphocyte）：37%。請問其絕對嗜中性白血球（absolute neutrophil count, ANC）數量為何？
(A) 24
(B) 144
(C) 156
(D) 444

- 72 小莉，因診斷有食道氣管瘻管（tracheo-esophageal fistula）而住加護病房，欲執行鼻胃管放置，下列護理措施之敘述，何者較不適當？
- (A)經鼻插入，長度由鼻尖到耳垂到劍突之長度為準
 - (B)可接上空針並反抽，如有胃液，表示鼻胃管位置正確
 - (C)灌食前，應以灌食空針反抽，評估是否有殘餘量，以了解消化吸收情形
 - (D)鼻胃管灌食後鼓勵採左側臥以預防吸入性肺炎
- 73 小佳，3 歲半女童，因經常泌尿道感染而反覆入院，此次入院準備作靜脈注射腎盂攝影（intravenous pyelogram, IVP）檢查，下列護理指導之敘述，何者不適當？
- (A)檢查目的為觀察上泌尿道結構
 - (B)檢查期間，為防止感染宜給予預防性抗生素
 - (C)檢查前，宜先確認有無對放射線顯影劑產生過敏
 - (D)檢查後，宜讓小佳攝取大量液體
- 74 陳小弟，4 歲，診斷急性腎絲球性腎炎（acute glomerulonephritis），下列護理指導何者最適當？
- (A)急性期合併水腫時，鼓勵多活動，排出過量體液
 - (B)急性期合併少尿時，鼓勵多攝入果汁、湯汁等，增加尿量
 - (C)急性期合併水腫時，宜以海苔、蘇打餅、洋芋片等食物，補充熱量
 - (D)急性期合併少尿時，避免牛奶、蛋類、香蕉等食物
- 75 有關兒童因幽門狹窄，需進行幽門切開術（pyloromyotomy），下列何者正確？
- (A)嬰兒需禁食至排氣後，始可給予少量的葡萄糖水或電解質口服液
 - (B)若給予葡萄糖水未出現嘔吐，8 小時後可開始漸進式給予餵食
 - (C)餵食時抬高頭部，餵食後應採左側臥或半坐臥位
 - (D)手術後，易造成腸阻塞宜補充脂溶性維生素
- 76 小明，14 歲，最近常抱怨大腿肌肉疼痛，經檢查後確認是生長痛（growing pain），下列護理措施何者不適當？
- (A)建議小明應維持日常活動
 - (B)減少參與太多不同種類的運動，適時休息以減緩疼痛
 - (C)必要時，可依醫囑給予止痛藥，如 Acetaminophen
 - (D)若每晚都持續嚴重疼痛，建議尋求醫療診治
- 77 有關兒童罹患妥瑞氏症（Tourette's disorder）的疾病特徵，下列敘述何者正確？
- (A)通常在 18 歲之前出現抽動病徵
 - (B)屬於精神心理疾病，會影響未來智能發展
 - (C)不自主的聲語型抽動相當罕見
 - (D)動作型抽動最常出現的是聳肩
- 78 小強，7 歲，罹患癲癇，有長期服用抗癲癇藥，包括 Phenytoin(Dilantin)及 Valproic acid(Depakine)，有關藥物護理指導，下列敘述何者錯誤？
- (A)指導父母須定時返院監測血中藥物濃度
 - (B)當疾病發作被控制時，可暫停服用藥物以降低副作用
 - (C) Dilantin 易造成牙齦增生，須執行良好的口腔護理
 - (D)雖有定時服用藥物，仍鼓勵維持正常生活習慣，以預防發作
- 79 有關腦性麻痺（cerebral palsy）兒童常見的健康問題，下列敘述何者較不適當？
- (A)皆合併有智力障礙
 - (B)普遍有粗動作發展遲緩
 - (C)常會合併有發音困難或語言障礙
 - (D)非進行性的神經病變
- 80 張小弟，5 個月大，因不慎跌落床下，診斷為顱內出血，有顱內壓增高（increase intracranial pressure, IICP）現象，有關其護理措施，下列敘述何者較不適當？
- (A)觀察兒童凶門有無緊繃鼓脹現象，每天測量頭圍
 - (B)鼓勵父母陪伴，並給予安撫，減少哭泣不安
 - (C)給予多喝水，增加體液容積以及腦組織灌流
 - (D)保持床頭抬高約 30~45 度，維持頭部於中線位置，並避免壓迫頸靜脈

測驗式試題標準答案

111年第二次專技高考中醫師考試分階段考試、營養師、護理師、社會工作師考試、111年
考試名稱：專技高考法醫師、語言治療師、聽力師、牙體技術師、公共衛生師考試、高等暨普通考試
驗光人員考試

類科名稱：護理師

科目名稱：產兒科護理學（試題代號：4104）

單選題數：80題 單選每題配分：1.25分

複選題數： 複選每題配分：

標準答案：

題號	第1題	第2題	第3題	第4題	第5題	第6題	第7題	第8題	第9題	第10題
答案	B	C	B	C	B	A	B	D	B	D

題號	第11題	第12題	第13題	第14題	第15題	第16題	第17題	第18題	第19題	第20題
答案	D	B	D	A	A	D	D	B	C	D

題號	第21題	第22題	第23題	第24題	第25題	第26題	第27題	第28題	第29題	第30題
答案	B	A	D	D	A	B	D	D	B	D

題號	第31題	第32題	第33題	第34題	第35題	第36題	第37題	第38題	第39題	第40題
答案	B	C	D	C	C	A	C	B	B	C

題號	第41題	第42題	第43題	第44題	第45題	第46題	第47題	第48題	第49題	第50題
答案	D	B	B	D	B	A	A	B	A	C

題號	第51題	第52題	第53題	第54題	第55題	第56題	第57題	第58題	第59題	第60題
答案	D	A	A	D	D	B	A	A	C	C

題號	第61題	第62題	第63題	第64題	第65題	第66題	第67題	第68題	第69題	第70題
答案	A	A	D	D	B	B	A	C	C	B

題號	第71題	第72題	第73題	第74題	第75題	第76題	第77題	第78題	第79題	第80題
答案	B	D	B	D	B	B	A	B	A	C

題號	第81題	第82題	第83題	第84題	第85題	第86題	第87題	第88題	第89題	第90題
答案										

題號	第91題	第92題	第93題	第94題	第95題	第96題	第97題	第98題	第99題	第100題
答案										

備註：